



Diapositiva G7.2.3

Analisi del cuoio capelluto, della pelle e dei capelli




Diapositiva G7.2.4a

Struttura del capello



Diapositiva G7.2.4b

Struttura della pelle



Diapositiva G7.1.3

Pagina 1 di 2

I test della Pelle e del Capello

Test	Quando farlo	Perché farlo	Come farlo	Risultati attesi	Conseguenze dell'omissione del test
Test dell'elasticità	Prima del trattamento chimico o durante il consulto.	Per verificare la condizione della corteccia.	Tirare i capelli tenendoli tra il pollice e l'indice.	Il capello si allunga e poi ritorna alla sua lunghezza originale.	Danno ai capelli, possibile rottura.
Test della porosità	Prima del trattamento chimico o durante il consulto.	Per verificare la condizione della cuticola.	Far scorrere le dita tra i capelli dalle punte alle radici.	I capelli risultano morbidi o ruvidi.	Danno ai capelli, possibile rottura.
Test dell'incompatibilità	Prima del trattamento chimico o durante il consulto.	Per verificare la presenza di sali metallici.	Immergere i capelli in un liquido composto da idrossido d'ammonio e perossido di idrogeno.	Il liquido frizza, fa le bolle, cambia di colore, si riscalda.	Danno ai capelli, possibile rottura.
Test della pelle	Prima di colorare i capelli.	Per sapere se il cliente è allergico al prodotto.	Pulire la pelle in una piccola zona dietro l'orecchio o del gomito e applicare una piccola quantità di prodotto. Controllare la reazione dopo 24-48 ore.	Nessuna reazione. Se la pelle reagisce: prude, è rossa, duole, trasuda. Se ciò accade non eseguire il colore.	Reazione allergica, possibile shock anafilattico.

I test della Pelle e del Capello

Test	Quando farlo	Perché farlo	Come farlo	Risultati attesi	Conseguenze dell'omissione del test
Test della ciocca	Durante lo sviluppo del colore o del decolorante.	Per verificare lo sviluppo del colore o del decolorante.	Rimuovere il prodotto da una ciocca di capelli e verificare lo sviluppo del colore.	Il colore ha raggiunto il risultato desiderato.	Tonalità del colore o del decolorante non corretta.
Test di sviluppo della permanente	Durante lo sviluppo della permanente.	Per verificare lo sviluppo della permanente.	Allentare un bigodino, spingere delicatamente i capelli verso le radici e guardare se si forma la S. Ripetere il movimento con altri bigodini.	Bene, se si forma la S lo sviluppo è completato.	Permanente con processo scarso o in eccesso.
Test pre-colorazione (spesso chiamato test del taglio)	Prima del trattamento di colore.	Per verificare l'effetto del colorante sui capelli.	Tagliare una piccola quantità di capelli, applicare il colorante proposto, farlo sviluppare e controllare il risultato.	E' risultato il colore adatto.	Colore non corretto.

Diapositiva G7.1.4

Servizi, Prodotti e Prezzi

Il parrucchiere	Il costo della servizio può variare dal parrucchiere senior al parrucchiere junior
Tempo necessario	I capelli possono essere più lunghi o più abbondanti della media. Un taglio potrebbe essere un restyle piuttosto che un semplice taglio.
Prodotto extra	La quantità normale del prodotto può non essere sufficiente se i capelli sono molto lunghi o molto abbondanti. Se vi è una grossa ricrescita, occorre considerare il costo per la maggiore quantità di prodotto.
Specializzazione	Il lavoro può richiedere delle abilità speciali, es. un raccolto o l'uso di una tecnica nuova.
Maggiore lavoro	Il cliente può necessitare di una doppia applicazione se ha una ricrescita troppo grossa. I suoi capelli possono necessitare di un taglio prima dello styling o di un modellamento dopo il taglio ecc.
Sconti	Se il lavoro viene fatto in un momento in cui ci sono gli sconti.

Diapositiva G7.2.2

Analisi del cuoio capelluto, della pelle e dei capelli (Diapositiva 1)

Condizione	Sintomi	Infettivo Contagioso	Servizio in salone	Rivolgersi al medico	Possibile causa
Psoriasi	Pelle argentata ispessita.	No	Si	Se la pelle è lacerata.	Malattia ereditaria. Causa sconosciuta.
Eczema	Pelle arrossata, infiammata che può lacerarsi e trasudare.	No	Si	Se la pelle è lacerata.	Irritazione o reazione allergica.
Alopecia	Parti calve, lisce e lucide.	No	Si	Se la condizione peggiora.	Ereditaria o connessa eventualmente allo stress.
Cute secca	Cuoio capelluto squamato, secco.	No	Si	Se la pelle è lacerata.	Produzione eccessiva di cellule cutanee. Causa sconosciuta.

Diapositiva G7.2.2

Analisi del cuoio capelluto, della pelle e dei capelli (Diapositiva 2)

Condizione	Sintomi	Infettivo Contagioso	Servizio in salone	Rivolgersi al medico	Possibile causa
Forfora	Cuoio capelluto squamato, secco.	Può essere infettiva.	Si	Se si sospetta un'infezione.	Produzione eccessiva di cellule cutanee. Possibile infezione fungina.
Impetigine	Macchie gialle, crostose.	Si	No	Si	Infezione batterica.
Tinea capitis (tricofizia)	Parti calve, grigie con un anello rosso all'esterno e i capelli a spazzola all'interno.	Si	No	Si	Infezione fungina.
Follicolite	Follicoli dei capelli infiammati.	Si	No	Si	Infezione fungina.

Diapositiva G7.2.2

Analisi del cuoio capelluto, della pelle e dei capelli (Diapositiva 3)

Test del contagio	Sintomi	Infettivo	Servizio in salone	Rivolgersi al medico	Causa
Pediculosis capitis	Graffi, presenza di pidocchi o lendini.	Si	No	Farmacia (shampoo)	Infestazione da pidocchi.
Scabbia	Macchie rosse, linee grigie.	Si	No	Si	Infestazione da acari che causano prurito.